

# ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19

## УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ!

ВАШЕ КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ - НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ! А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛНОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАТЬ НАШ ПОТЕНЦИАЛ В ДОСТИЖЕНИИ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ, МЫ ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ НЕКОТОРЫЕ (ОСНОВНЫЕ И ВАЖНЫЕ) ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ НАМ В НАШЕЙ РАБОТЕ:

1. Вакцинации подлежат лица, **не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к SARS-CoV-2** по результатам лабораторных исследований
2. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ВАКЦИНАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ:**
  - аллергия на компоненты вакцины
  - тяжелые аллергические реакции в анамнезе
  - острые инфекционные и неинфекционные заболевания
  - обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии)
  - беременность и период грудного вскармливания
  - возраст до 18 лет
3. Перед проведением вакцинации **необходим обязательный осмотр врача с измерением температуры**, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, осмотром зева, на основании которых врач-специалист определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации. Врач расскажет Вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации
4. Вакцинацию проводят **в два этапа**: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно. **На 21 день** вводят компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно
5. **В течение 30 мин после вакцинации** необходимо оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических реакций
6. После проведения вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, болями в суставах, мышцах, общей слабостью, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, покраснение, отёчность) реакции. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ в течение 3-х дней после вакцинации** не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять средства от аллергии.

При повышении температуры тела после вакцинации - нестероидные противовоспалительные средства.



Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.



Департамент  
здравоохранения  
ЯНАО



ГБУЗ ЯНАО  
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ



Ямал - территория здоровья!  
#ямалздоров